

Pister le grand gibier : les clés pour identifier sanglier, cerf et chevreuil

Identifier les empreintes au sol

- Sanglier : les gardes (doigts latéraux) sont presque toujours marquées, situées plus bas et en arrière du sabot.
- Chevreuil : empreinte de 4 à 5 cm. Les doigts sont pointus et resserrés. Le pied du mâle est plus large et trapu, celui de la femelle plus fin et allongé.
- Cerf : empreinte de 8 à 10 cm. Les doigts sont arrondis. Les gardes sont situées au niveau du talon et n'apparaissent qu'en terrain meuble.

Reconnaître les indices de présence

- Bauge (sanglier) : dépression aménagée dans le sol, souvent tapissée de branchages.
- Reposée (cerf/chevreuil) : simple enfoncement dans l'herbe ou la terre.
- Frottis : le sanglier frotte son corps (traces de boue et poils bas), tandis que le cerf et le chevreuil frottent leurs bois (dégâts d'écorce en hauteur).

Analyser les excréments

- Sanglier : formes diversifiées, allant de l'amas informe aux cylindres agglomérés.
- Cerf : crottes cylindriques en forme de glands, mesurant environ 3 cm.
- Chevreuil : crottes plus petites (environ 1 cm) et nettement pointues.

Observer la foulée (distance entre deux empreintes)

- Chevreuil : foulée moyenne de 40 à 50 cm à la marche.
- Cerf : foulée moyenne de 70 à 90 cm à la marche.